

albo-hirsuta, sursum pilis gadatim brevioribus, apice sub microscopico granulata.

Nom. Jap. *Huzi-senninsō* (nom. nov.)

Hab. Nippon Hondo Prov. Suruga: Kanakuso 1,080 m alt. in Mt. Huzi (BUNZO HAYATA 29 VIII, 1924) Omiyaguti ca. 1,000 m alt. ibid. (K. HISAUTI 23 VIII, 1932-Typus fl. in Herb Univ. Imp. Tokyo.) Mt. Tensigatake (T. MOMIYAMA 7 IX, 1932)

Prov. Sagami: Mt. Oyama (K. HISAUTI 23 X 1932-Typus fr. in Herb. Univ. Imp. Tokyo) Planta endemica.

Note: The present species is somewhat akin to *Clematis paniculata* THUNBERG in general aspect except that this turns dusky purple when dried, and its larger and more acuminate leaflets, bases of which are heart shaped and more or less prominently veined on the under surfaces. Cauda is always longer than that of the latter.

(K. HISAUTI)

This is also allied to *C. chinensis* OSBECK, but the latter has broad ovate achenes which are patently hirsute, smaller flowers with acutish sepals and generally narrower leaflets. It is also distinguishable from *C. Benthamiana* HEMSLEY by having thinner and broader leaflets with less prominent veinlets and glabrescent inflorescences.

(H. HARA)

### ○Linné ノ三名命名ト日本産ノ *Melilotus* 屬ノ學名

LINNÉ ノ Species Plantarum 第1版 (1753) = 出タ所謂二名命名法が今日用ヒラレテキル學名ノ意味ヲ提唱サレタモノデナイ事ハ中井先生ノ御説明 (上記ノ書ノ東京翻刻版ノ解説) 等ニヨツテ明デアル。實際同書ヲ披イテ見ルト *Impatiens noli tangere* (p. 938, 種名ノ譯—觸レテハ嫌、きつりふね)、*Adiantum Capillus veneris* (p. 1096, ビーナスノ髮ノ毛、ほうらいしだ) 等三名命名ガアル。コレハ萬國植物命名規則 (3版) 27條ニヨツテ夫々 *Impatiens noli-tangere*, L., *Adiantum Capillus-Veneris* L. トシナケレバナラナイ。モット奇妙ナノハ同條ノ例ニモアル様ニ *Scandix Pecten* ♀ (p. 256, ビーナスノ櫛、ながみのせりもどき)、*Veronica Anagall.* ♀ (p. 12, 水中生ノるりはこべ屬、かはぢしゃ) ハ夫々 *Scandix Pecten-Veneris* L., *Veronica Anagallis-aquatica* L. 等トナル事デアル (コレヲノ難解ノ符號ハ元ノ Linnean Society ノ祕書デアリ、例ノ有名ナ植物術語辭典ノ著者デアル B.D. JACKSON ガ翻譯シタモノデアルト、中井先生カラ聞イタ)。LINNÉ ノ同書ノ中ニハコノ様ニハイフンデ接合シテ用ヒナケレバナラヌ學名ガ 64 個モアル。コレヲ中ニハ風變リデ面白イモノガ多イノデ、種名ノミヲ少々譯シテ見ルト次ノ様デアル。(文字ノ大小ハ LINNÉ ノ原著通りニシタ) *Inula Oculus Christi* (p. 881, キリストノ眼)、*Rhamnus Spina Christi* (p. 195, キリストノ棘—例ノ棘ノ冠)、*Pedicularis Sceptum Carolin.* (p. 608, Carolini?, カロリン王ノ笏)、*Xanthoxylum Clava herculis* (p. 270, ヘルクレスノ棒)、*Agrostemma Flos jovis* (p. 436, ジュピターノ花)、*Coix Lachryma*

*Jobi* (p. 972, ヨブノ涙——舊約聖書ヨブ記デ有名、じゅずだま)、*Thlaspi Bursa pastoris* (p. 647, 農夫ノ財布)、*Elymus caput medusae* (p. 84, *Medusæ*?, メヂューサノ頭)、*Vaccinium Vitis idæa* (p. 351, イダエノ葡萄——イダエ山ハクリート島ニアル、こけもも)、*Amaryllis Bella donna* (p. 293, 美シイ婦人、ほんあまりりす)、*Vitex Agnus Castus* (p. 638, 無垢ノ小羊、せいやうにんじんぼく)、*Convolvulus Pes capreae* (p. 159, 牝山羊ノ足、ぐんばいひるがほ)、*Ipomoea Pes tigridis* (p. 162, 虎ノ足、きくざあさがほ)、*Hedysarum Caput galli* (p. 751, ゴール人ノ頭)、*Crataegus Crus galli* (p. 476, ゴール人ノ十字)、*Erythronium Dens canis* (p. 305, 犬ノ齒)、*Ophrys Nidus avis* (p. 945, 鳥ノ巢、さかねらん)。尙 *Epidendrum Flos aëris* (p. 952, 空中ノ花)、*Byssus Flos aquae* (p. 1168, 水ノ花) 等ハ生態モ示シテキテ、無技巧ノ技巧ト言フカ、上手ナモノデアル。コレヲ美シイ種名共ハ、タトヘ屬名コソ變化シテキテモ、尙生キテ用ヒラレテキルノデアル。*Alisma Plantago* Δ (p. 342) ハ Δ ト ∇ トノ誤植デ *A. Plantago-aquatica* L. (さじおもどか) デアラウシ、又 *Sysymbrium Nasturtium* ∇<sub>m</sub> (p. 657) ハ m ガーツ多イガヤハリ、*S. Nasturtium-aquaticum* L. デアラウ。*Panicum crussgalli*, *Solidago Virgaurea* (金色ノ枝) ハ始メカラ種名ガー語ニナツテキルカラハイフンハ不用デアル。

ココデ一番面白イノハ *Trifolium* 屬ノ所 (p. 764-765) デアル。LINNÉ ハコノ屬ヲ2分シテ *Meliloti* 群ト *Lotoidea* 群ニ分ツテキル。ソシテ *Meliloti* 群ニハ8種類アツテ、夫々 *Trifolium M. indica*, *Trifolium M. officinalis*, ……等ト書イテアル。コノ場合上掲ノ27條ヲ嚴格ニ適用スルト、種名ハ夫々 *Melilotus-indica*, *Melilotus-officinalis* ……ト譯ス事ニナル。コノ見地デ、シカモ現今デハコレ等ガ *Melilotus* 屬ニ入ル事ヲ考ヘテ、既ニ *Melilotus Melilotus-indicus* (L.) ASCHERSON et GRÆBNER, Nordost. deutsch. Fasc. l. p. 435 (1898), *Melilotus Melilotus-officinalis* (L.) ASCHERS. et GRÆB. l. c. 等ノ組合セガ出テ来キル。シタガツテ *Melilotus indica* (L.) ALLIONI, *M. officinalis* (L.) LAMARCK 等ハ用ヒラレナイ。

*Melilotus* ハギリシヤ語ノ *Melilotos* ニ由來シ、元來ハ女性名調デアル。植物學者ニヨリ、男性ニ用ヒル人モ女性ニ用ヒル人モアル。*Melilotus* [TOURNEFORT ex HALLIER Enum. Stirp. Helv. 2, p. 587 (1842)]; MILLER, Gard. Dict. ed. 4, 2, p. me (1754) 屬ノ性ハ命名規則72條ニヨレバ MILLER = 随ツテ女性トナル。ソレデ ASCHERSON 等ノ組合ニヨル學名ハ種名ノ語尾ヲ男性ニ變ヘテ用ヒル事ニナル。

次ニ日本産ノ *Melilotus* ノ索引ヲ掲ゲル。

1. 莖葉ノ托葉ハ披針形又ハ廣披針形デ基部ニハ齒牙縁ガアル。(花ハ黄色デ、長サ 2.2-2.8 mm) …… *M. Melilotus-indica* ASCH. et GRÆB. (こしながははぎ、新)
1. 莖葉ノ托葉ハ絨形、全縁。……………2
2. 子房ニ毛ガアル。花梗ハ割合ニ細ク、花ハ垂レ下リ氣味ニナル。(花ハ黄色デ、長サ 5-7 mm) …… *M. altissima* THUILLIER (せいたかこごめはぎ、新)
2. 子房ハ平滑。花梗ハ割合ニ短ク、花ハ點頭スル。……………3

3. 花ハ白色。旗瓣ハ翼瓣ヨリ著シク長イ。(花ハ長サ 3-4.2 mm) .....  
 ..... *M. alba* DESROUSSEAUX (しろばなのしながははぎ)
3. 花ハ黄色。旗瓣ト翼瓣ノ長サハ殆ンド等シイ。.....4
4. 莢ニハ柄ガナクテ、直接ニ萼筒ノ内ニ坐ル。(花ハ長サ 5.5-7 mm) .....  
 ..... *M. suaveolens* LEDEBOUR (えびらはぎ)
4. 莢ニハ柄ガアツテ、萼筒ノ前方ニ飛び出シテキル。(花ハ長サ 5.5-7 mm) .....  
 ..... *M. Melilotus-officinalis* ASCH. et GRAEB. (せいやうえびらはぎ)
- コレヲ中 *M. Melilotus-officinalis* ハ歐洲ノ標本シカ見テキナイガ、國內デ栽培サレテキル形跡ガアルカラ特ニ加ヘタ。*M. altissima* ハ歐洲ノ原産デアルガ、北米ニモ時々無意識ニ輸入サレルト言フ。日本ニハ新報告デアル。*M. Melilotus-indica* (= *M. parviflora* DESF.) ハ小笠原島ニ多ク、小生ニコノ小文ヲ書ク動機ヲ與ヘタガ、内地ノ南部ニモアリ、臺灣ニモ多イ。*M. suaveolens* ハ type locality ノシベリアハ固ヨリ内地ノ他ニ朝鮮、滿洲、琉球、臺灣ニ多イガ、東大ノ標本ニヨルド支那ニモ南北ヲ通ジテ多イ。LECOMTE ハ印度支那カラモ亦コノ種ヲ報告シテキル。

(津 山 尙)

### 〇えのきあふひノ學名

えのきあふひノ學名ハ *Malva coromandeliana* L., Sp. Pl. ed. 1, p. 687 (1753) ニ基ケカラニハ *Malvastrum* 屬ノ下ニハ *M. coromandelianum* (L.) GARCKE デアル。MERRILL ガ “Flora of Manila” ヤ “An Enumeration of Philippine Flowering Plants” 等ノ中デ誤植シテ以來、*M. coromandelinum* ト間違フ人多イ。Coromandel ハ地名デブラジルヤニュージランドニモアルガ、コノ場合ハ印度ノ東南ノ Coromandel 海岸ヲ意味スル事ハ LINNÉ ガ Sp. Pl. デ異名トシテ引用シタ PLUKNET ノ *Almagesti Botanici Mantissa*, p. 10 (1700) ノ *Althæa coromandeliana* ノ條ニ ad oras Coromandel トアルノヲ見テ明カデアル。

(津 山 尙)